四倍体马铃薯 (*S. Tuberosum*) 核型分析

肖增宽 陈伊里 吕文河 邹得堂

(东北农业大学 哈尔滨 150030)

摘要

东农 303 (*S. Tuberosum*) 核型为: $2=4x=48=5 \times (4)M+5 \times (4)SM+1 \times (4)ST+1 \times [(2)ST+(2)]$, 组型为: $2n=4x=11IV++(1II+1II)=5M(B, E, G, K, L)+5SM(A, C, D, H, J)+1ST(I)+1[(T+ST)(F)]$ 。

$S_{4-5-3-6-5-1-50-(10)}$ (*S. Tuberosum*) 核型为: $2n=4x=48=4 \times (4)M+6 \times (4)SM+1 \times (4)ST+1 \times [(2)ST+(2)T]$, 组型为: $2n=4x=11IV+(1II+1II)=4M(E, G, K, L)+6SM(A, B, C, D, H, J)+1ST(I)+1[(T+ST)(F)]$ 。

A 组与 F 组带有髓体, 两份供试材料的对应组中染色体略有分化, 但基本一致。

1 前言

马铃薯可以有性繁殖, 也可无性繁殖, 并且常有 $2n$ 配子突变体发生, 所以在马铃薯不同种间, 染色体倍性很复杂。研究表明, $2n=24, 36, 48, 60, 72$ 及 84 等不同倍性的种均有存在, 遗传组成较为复杂。其中 $2n=2x=24$ 与 $2n=4x=48$ 较为普遍, 是栽培的主要类型。不同倍性中, 还有同源、异源或种内、种间杂种之别。为了深入了解马铃薯的遗传背景, 从遗传角度分析研究马铃薯进化方法与途径, 这将进一步提高育种理论水平, 增加预见性, 为染色体水平育种奠定基础。

马铃薯核型及染色体变异, 目前尚未见详细报道。

2 材料与方 法

材料: 东农 303 (Anemonex Katahdin 杂

交后代) 与 *S. Tuberosum* 高世代自交系 $S_{4-5-3-6-5-1-50-(10)}$ (以下简称 S_4)。

根尖处理: 沙培诱发根尖, 截取根尖 (0.5cm 左右) 放入对二氯苯饱和液中, 温室下预处理 24 小时左右, 卡诺液固定。

制片方法: 先将根尖以 $0.2N$ HCl $60 \pm 2^\circ C$ 恒温水解 6 ~ 8 分钟, 然后用 1% 醋酸洋红预染 2 小时以上, 再用石炭酸品红染色液压片。选取好的分裂相进行显微摄影。

3 试验结果与分析

a. 四倍体马铃薯染色体数目较多, 而且较小, 要想得到理想的制片 (核型完整、染色体全部分散、长度适中、形态清楚), 预处理时间很关键。处理时间过长, 对染色体分散有利, 但染色体太短, 结构、形态特征没有典型性 (见图版 a); 若处理时间较短, 则染色体收缩度不够, 染色体不易分散, 形态不清, 相互重叠缠绕, 无法测量分析 (见图版 b), 一般

图 1 东农 303 与 S₄₋₅₋₃₋₆₋₅₋₁₋₅₀₋₁₀ 核型分析

情况下,对二氯苯饱和溶液室温下处理 24 小时为佳。

b. 核型与组型分析,必须对大量的分裂相进行仔细的观察对比,综合分析判断,才能较准确地配组和确认,然后,对较典型的分裂相进行拍照、冲片(图版 c 与 d)。

c. 制片时发现,A 组与 F 组特别是 F 组的髓体易压跑或丢失,因此,制片时力度要适中。

d. 染色体长度由于预处理时间或所处于细胞分裂阶段不同而变化。所以,染色体绝对长度意义不大,主要是通过相对长度和臂

比进行分析。本实验染色体长度、臂比、分类及相对长度等测量的结果如表 1 和表 2。

分析两表数据和分类可以看出,除 B 组有 M 和 SM 变动外,其它各组基本一致,而 B 组 M 与 SM 的不同,也可能是误差造成的。F 组内部染色体分化较明显,但仍属于 ST 与 T 相近的类型。

e. 染色体核型与组型由表 1 与表 2 及图版 c 与 d 共同测量分析对比确定的。

f. 东农 303 与 S₄ 都是同源四倍体(东农 303 诱导的双单体育性正常,也可证明这一点),48 条染色体可分为 12 组(A、B、C、D、

表 1 东农 303 染色体核型与组型分析

组别	A					B			C				D				E			F				
编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	10.0	10.0	10.0	9.5	7.8	6.5	7.5	7.5	6.6	6.8	6.9	6.6	6.4	6.2	6.4	6.3	5.5	5.6	5.5	5.6	8.7	8.8	7.6	7.6
S	5.5	5.0	4.8	4.8	6.0	6.2	5.7	4.6	3.3	3.3	3.3	3.4	3.1	3.2	3.2	3.3	3.5	3.4	3.4	3.5				1.2 1.3
L/S	1.82	2.00	2.08	1.98	1.17	1.05	1.32	1.63	2.00	2.06	2.03	2.00	2.06	1.94	2.00	1.91	1.57	1.65	1.62	1.60				6.30 5.05
分类	SM					M			SM				SM				M			T	ST			
$\bar{X}$	14.90					12.80			10.00				9.53				9.00			8.80				
相对长度 %	13.52					11.61			9.07				8.65				8.16			7.98				

组别	G					H			I				J				K			L				
编号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
L	4.8	4.5	4.5	4.4	5.6	5.4	5.3	5.4	5.8	5.8	6.0	5.8	5.0	5.1	5.2	5.2	4.2	4.1	4.1	4.3	3.8	4.0	4.0	4.1
S	3.2	3.4	3.5	3.5	2.2	2.2	2.2	2.1	1.8	1.7	1.6	1.8	2.5	2.4	2.3	2.4	3.0	3.4	3.2	3.1	3.0	3.2	3.0	3.0
L/S	1.50	1.30	1.20	1.26	2.56	2.45	2.41	2.57	3.22	3.47	3.75	3.22	2.00	2.13	2.26	2.17	1.40	1.21	1.20	1.39	1.29	1.25	1.33	1.37
分类	M					SM			ST				SM				M			M				
$\bar{X}$	7.95					7.75			7.60				7.53				7.35			7.03				
相对长度 %	7.21					7.03			6.89				6.83				6.67			6.38				

表 2 S₄ 染色体核型与组型统计分析

组别	A					B			C				D				E			F				
编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
L	10.9	10.7	10.2	10.4	9.7	9.6	8.4	9.0	7.4	7.5	7.5	7.6	7.2	7.5	7.3	7.5	5.6	5.5	5.4	5.7	8.7	8.9	7.4	7.3
S	4.9	4.9	5.0	5.0	4.4	4.1	4.7	4.3	3.6	3.6	3.3	3.5	2.6	2.4	2.4	2.4	3.4	3.3	3.2	3.4				1.4 1.3
L/S	2.22	2.10	2.04	2.08	2.58	2.34	1.79	2.09	2.06	2.08	2.27	2.08	2.77	2.13	2.04	2.13	1.65	1.67	1.69	1.60				5.29 5.62
分类	SM					M			SM				SM				M			T	ST			
$\bar{X}$	15.50					13.55			10.83				9.83				9.00			8.75				
相对长度 %	13.77					12.04			9.62				8.73				8.00			7.77				

组别	G					H			I				J				K			L				
编号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
L	4.4	4.5	4.7	4.6	5.2	5.4	5.2	5.3	6.3	6.0	6.3	6.3	4.6	4.7	4.7	4.6	4.2	4.3	4.2	4.3	3.2	3.1	3.2	3.3
S	4.2	4.2	4.0	4.0	2.8	2.9	2.8	2.0	1.6	1.5	1.8	1.7	2.5	2.7	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.6	3.0	3.0	3.0	3.1
L/S	1.05	1.07	1.10	1.15	1.06	1.06	1.06	1.09	3.96	4.00	3.50	3.71	1.04	1.74	1.01	1.77	1.60	1.59	1.56	1.59	1.07	1.03	1.03	1.06
分类	M					SM			ST				SM				M			M				
$\bar{X}$	8.75					8.10			7.88				7.25				6.93			6.25				
相对长度 %	7.77					7.20			7.00				6.44				6.15			5.55				

E、F、G、H、I、J、K、L), 每组含有 4 条同源染色体, 其中 F 组染色体分化明显, 21 与 22 号染色体顶端只有髓体, 等同于端着丝粒 T 型, 而 23 与 24 为 ST 类型。

4 结 论

a. 根据表 1 与图版 c 分析结果可以得出东农 303 核型为: $2n=4x=48=5 \times (4)M + 5 \times (4)SM + 1 \times (4)ST + 1 \times [(2)ST + 2(2)T]$, 组型为: $2n=4x=11IV + (III + III) = 5M(B, E, G, K, L) + 5SM(A, C, D, H, J) + 1ST(I) + 1[(T + ST)(F)]$ 。

b. 由表 2 和图版 d 分析得出 S_4 的核型为: $2n=4x=48=4 \times (4)M + 6 \times (4)SM + 1 \times (4)ST + 1 \times [(2)ST + (2)T]$, 组型为: $2n=4x=11IV + (III + III) = 4M(E, G, K, L) + 6SM(A, B, C, D, H, J) + 1ST(I) + 1[(T + ST)(F)]$ 。

c. 大量分裂细胞观察分析表明 A 组与 F 组染色体带有髓体, 其它组染色体是否有髓体尚须进一步研究。

参 考 文 献

- 1 唐洪明等译. 马铃薯遗传学. 农业出版社, 1981
- 2 朱凤綏. 植物染色体及染色体技术. 科学出版社, 1982
- 3 朱凤綏. 植物染色体分带技术汇编. 中国农科院, 1988

KARYOTYPE ANALYSIS OF TETRAPLOID POTATOES (*SOLANUM TUBEROSUM*)

Xiao Zengkuan, Chen Yili, Lu Wenhe and Zou Detang

(Northeast Agricultural University)

ABSTRACT

The karyotype of cultivar NEA303 is $2n=4x=48=5 \times (4)M + 5 \times (4)SM + 1 \times (4)ST + 1 \times [(2)ST + (2)T]$, and the genome is $2n=4x=11IV + (III + III) = 5M(B, E, G, K \text{ and } L) + 5SM(A, C, D, H \text{ and } J) + 1ST(I) + 1[(T + ST)(F)]$. The karyotype of a clone $S_{4-5-3-6-5-1-50-(10)}$ is $2n=4x=48=4 \times (4)M + 6 \times (4)SM + 1 \times (4)ST + 1 \times [(2)ST + (2)T]$, and the genome is $2n=4x=11IV + (III + III) = 4M(E, G, K \text{ and } L) + 6SM(A, B, C, D, H \text{ and } J) + 1ST(I) + 1[(T + ST)(F)]$.

The chromosomes in A and F group have satellite. the chromosomes of corresponding group in the two plant materials studied are differentiated to some extent, but basically are the same.