

全国马铃薯主要优良品种(九)

叶超林

鄂芋1号

品种来源 湖北省兴山县农科所用北斗星作母本, 康革1号作父本, 1975年杂交育成。原株系号7621-12。1989年经湖北省农作物品种审定委员会审定并确定推广。该品种1985~1987年参加省区域试验, 比对照(米拉)增产一成多, 一般亩产可达1500多公斤。

特征特性 植株较矮, 薯块芽眼较深, 大、中薯率较高, 食味中等。生育期93天, 较抗晚疫病, 粉痂病和青枯病, 淀粉含量较低, 约14%。

栽培要点 因生育期较短, 要抓紧田间管理。

分布范围 主要分布在湖北省城镇郊区。

津引薯1号

品种来源 天津市蔬菜所1983年引自美国。原名Norland。1989年经天津市农作物品种审定委员会审定并确定推广。该品种一般亩产春播1500多公斤, 秋播1200多公斤。

注: 有关1989年前各省、市、区(县)审定马铃薯品种, 已全部作了更正。1991年首次介绍1990年以来审定(认定)马铃薯品种。为了便于掌握这方面情况, 请各省、市、区有关同志将新审定(认定)品种寄送叶超林同志。通讯处: 北京农展馆南里11号农业部全国种子总站。

特征特性 直立型, 株高45厘米, 分枝少, 根系发达, 生长势强。叶片肥大, 叶色墨绿。薯块长椭圆型, 薯皮浅粉色, 薯肉白色, 芽眼浅, 肉质脆嫩。生育期85天左右。可作二季栽培。结薯较集中。较抗病, 耐盐碱。品质较好。

栽培要点 在天津春季栽培3月上旬催芽, 3月下旬播种, 6月上中旬收获。秋季栽培7月中旬催芽, 8月初播种, 10月底收获。每亩种植7000株左右。

分布范围 主要分布在天津市。

藏薯1号

品种来源 西藏自治区农科所1962年用疫畏它紫果的种子经种植后, 从实生苗中选出。1985年经西藏农作物品种审定委员会审定并确定推广。该品种一般亩产2000多公斤。

特征特性 植株直立, 株高85厘米, 复叶顶部小叶椭圆形, 叶绿色, 花冠白色, 花粉较多, 能天然结果。薯块扁圆, 皮黄色, 芽眼较浅, 薯肉淡黄色。生育期135天左右。生长势强, 分枝强盛, 块茎休眠期长, 耐贮藏, 食味佳。抗寒、抗旱、高产、耐产, 耐肥。结薯较集中。

栽培要点 在西藏拉萨地区一般播种期为4月下旬, 一般每亩种植3000穴。施足基肥, 适时浇水、追肥。

分布范围 主要分布在西藏。